

MATRIZ: R. Prof. Venina Corrêa Torres, 23
Nova Iguaçu 5/501 - Parte - CEP. 26.220-100 ☎ 21 2667-3378

FILIAL I: Trav. Prof. Augusto Rodrigues,
Nova Iguaçu 104 - Parte - CEP 26.210-290 ☎ 21 2668-1928

FILIAL II: Rua Capitão Gaspar Soares,
Nova Iguaçu 207 - Parte - CEP 26.255-040 ☎ 21 2668-0089

FILIAL III: Rua Getúlio Vargas, 1640 - Parte
Nilópolis CEP 26.510-010 - Centro ☎ 21 2691-8601

FILIAL IV: Av. José Mariano Passos, 1960
Belford Roxo Parte - Centro - Belford Roxo
CEP 26.130-570 ☎ 21 2761-0534

FILIAL V: Rua Tomas Fonseca, 241 Loja
Comendador Soares Parte - Comendador Soares - NI
CEP 26.280-375 ☎ 21 2669-2585

CRM - 52.0115861-9-PJ SES/SMS 2015/237193

MATRIZ: Rua Professora Venina Corrêa
Torres, 23 - Grupo 502 a 505
Centro - Nova Iguaçu - RJ ☎ 21 2667-3378 (Fax)
CEP.: 26.220-100

FILIAL: Rua Thomas Fonseca, 241
Comendador Soares Nova Iguaçu - RJ
CEP.: 26.280-375 ☎ 21 2669-2585 (Fax)

SES-461 / 2007 CRBM Nº 2012-3222-0

www.terraperreira.com.br

Av. Dr. Mário Guimarães N° 318 - SI 404
Condomínio Vitality - Centro
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro ☎ 21 2667-3558 (Fax)
Cep.: 26.255-230

SMS Nº 46605-1

www.labmeg.com.br

PERFIL PRÉ-NATAL

- Hemograma
- Tipagem Sanguínea
- Sífilis (VDRL)
- Urina I
- Urocultura
- Antibiograma de Patologia Clínica
- Glicemia
- HIV
- Toxoplasmose IgG
- Toxoplasmose IgM
- HCV
- Rubéola IgG
- Rubéola IgM
- Citomegalovírus IgG
- Citomegalovírus IgM
- EPF

Preço: R\$ 290,00

ORIENTAÇÕES:

JEJUM NECESSÁRIO DE 8 HORAS.

UROCULTURA - EAS (CULTURA DE URINA)

*Frasco para coleta: fornecido pelo laboratório ou adquirido em farmácia (estéril).

Material: urina – preferencialmente, primeira urina da manhã (amostra isolada recente).

Preparo do paciente:

- Evitar relação sexual por 24 horas antes da coleta de urina;
- Não fazer uso de cremes locais 24 horas antes da coleta;
- Em caso de crianças não colher material "espremendo" fralda;
- Informar antimicrobianos, (antibióticos) em uso.

Coleta de urina:

- Fazer assepsia (ou tomar banho) antes de colher o material;
- Colher a primeira urina da manhã ou após intervalo de 4 horas após a última micção;
- Desprezar o primeiro jato de urina sem interromper a micção, e recolher o jato médio;
- Fechar o frasco imediatamente, certificando-se que está vedado e colocá-lo em saco plástico para evitar derramamento. Não expor ao calor excessivo;
- Enviar ao laboratório no prazo máximo de duas horas, guardando em geladeira até o momento de sair de casa;
- Se preferir pode levar em gelo. (não congelar).

Caro Dr., em caso de dúvida, discordância clínica e ou divergência nos resultados, por favor nos contactar e ou orientar seu paciente a fazê-lo. Estamos sempre receptivos e prontos a esclarecer e dirimir dúvidas.

Os resultados dos testes laboratoriais sofrem influências de estados fisiológicos e ou patológicos, uso de medicamentos incluindo dieta alimentar e ou tempo de jejum. Somente um profissional qualificado tem condições de interpretar, corretamente estes resultados.