DIAGNOTEST LANGITUTE OF PRINCIPAL CIRICA LANGITUTE OF PRINCI			
MATRIZ: Nova Iguaçu	R. Prof. Venina Correâ Torres, 23 S/501 - Parte - CEP. 26.220-100	© 21 2667-3378	
FILIAL I: Nova Iguaçu	Trav. Prof. Augusto Rodrigues, 104 - Parte - CEP 26.210-290	© 21 2668-1928	
FILIAL II: Nova Iguaçu	Rua Capitão Gaspar Soares, 207 - Parte - CEP 26.255-040	© 21 2668-0089	
FILIAL III: Nilópolis	Rua Getúlio Vargas, 1640 - Parte CEP 26.510-010 - Centro	© 21 2691-8601	
FILIAL IV: Belford Roxo	Av. José Mariano Passos, 1960 Parte - Centro - Belford Roxo CEP 26.130-570	© 21 2761-0534	
FILIAL V: Comendador Soares	Rua Tomas Fonseca, 241 Loja Parte - Comendador Soares - NI CEP 26.280-375	© 21 2669-2585	
CRM - 52.0115861-9-PJ SES/SMS 2015/237193			

(TE	BIOMÉDICO RRA E I R A E APOIO MÉDICO HOSPITALAR		
MATRIZ:	Rua Professora Venina Correâ Torres, 23 - Grupo 502 a 505 Centro - Nova Iguaçu - RJ CEP.: 26.220-100	© 21 2667-3378 (Fax)		
FILIAL:	Rua Thomas Fonseca, 241 Comendador Soares Nova Iguaçu - RI CEP.: 26.280-375	© 21 2669-2585 (Fax)		
	SES-461 / 2007 CRBM N	№ 2012-3222-0		
www.terrapereira.com.br				



www.labmeg.com.br

PERFIL PREVENÇÃO CÂNCER DA PRÓSTATA

- PSA Total e Livre
- Urina I

Preço: R\$ 45,00

Orientações:

INSTRUÇÕES DE COLETA PSA/PSA LIVRE

Preparo do Paciente:

- JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
- Não ter ejaculado nas últimas 48 horas;
- Não ter feito exercício em bicicleta (ergométrica ou não), ter andado de motocicleta ou feito equitação nos últimos dois dias;
- Não ter recebido sondagem uretral ou feito exame de toque retal nos últimos três dias;
- Não ter feito cistoscopia nos últimos cinco dias;
- Não ter realizado ultrassonografia transretal nos últimos sete dias;
- Não ter feito colonoscopia ou retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias; E urodinâmico nos últimos 21 dias;
- Não ter feito biópsia de próstata nos últimos 30 dias;

Obs.: Em clientes que tenham feito prostatectomia total (retirada total da próstata), o preparo não é necessário.

UROCULTURA - EAS (CULTURA DE URINA)

*Frasco para coleta: fornecido pelo laboratório ou adquirido em farmácia (estéril).

Material: urina – preferencialmente, primeira urina da manhã (amostra isolada recente).

Preparo do paciente:

- Evitar relação sexual por 24 horas antes da coleta de urina;
- Não fazer uso de cremes locais 24 horas antes da coleta;
- Em caso de crianças não colher material "espremendo" fralda;
- Informar antimicrobianos, (antibióticos) em uso.

Coleta de urina:

- Fazer assepsia (ou tomar banho) antes de colher o material;
- Colher a primeira urina da manhã ou após intervalo de 4 horas após a última micção;
- Desprezar o primeiro jato de urina sem interromper a micção, e recolher o jato médio;

Fechar o frasco imediatamente, certificando-se que está vedado e colocá-lo em saco plástico para evitar derramamento. Não expor ao calor excessivo;

• Enviar ao laboratório no prazo máximo de duas horas, guardando em geladeira até o momento de sair de casa. Se preferir pode levar em gelo. (não congelar).

Caro Dr.:, em caso de dúvida, discordância clínica e ou divergência nos resultados, por favor nos contactar e ou orientar seu paciente a fazê-lo. Estamos sempre receptivos e prontos a esclarecer e dirimir dúvidas.

Os resultados dos testes laboratoriais sofrem influências de estados fisiológicos e ou patológicos, uso de medicamentos incluíndo dieta alimentar e ou tempo de jejum. Somente um profissional qualificado tem condições de interpretar, corretamente estes resultados.